




Les prairies maigres de fauche regroupent plusieurs types d'habitats différents



Clé de détermination des types d'habitats (en vert : espèces illustrées) :

1 > prairie de fauche non à moyennement amendée, comportant au moins 5 des espèces suivantes : *petite pimprenelle, brome dressé, sauge des prés, primevère officinale, salsifi des prés, crépide bisannuelle, knautie des champs, gaillet blanc, sainfoin ou esparcette* = prairie de fauche d'**intérêt communautaire_2**

> prairie de fauche améliorée ne comportant pas ou très peu des espèces précédentes (à part *salsifi des prés* et *crépide bisannuelle*), mais dominée par les espèces suivantes : *renoncule âcre, brome mou, pissenlit, ray-grass anglais, pâturin commun, berce* ... = prairie de fauche améliorée à ray-grass (**non** d'intérêt communautaire).

2 > prairie de fauche amendée, comportant quelques espèces des pelouses (*brome dressé, petite pimprenelle, sauge des prés, primevère officinale*), mais dominée toutefois par les espèces typiquement prairiales : *trèfle des prés, trèfle rampant ou trèfle blanc, pâturin commun, fétuque roseau, achillée millefeuilles, avoine élevée, berce*... absence des espèces strictement inféodées au pelouses : *scabieuse colombarie, laïche glauque, serpolet, brachypode penné* = habitat de type **prairie** de fauche **semi-améliorée** 5

> prairie très peu ou non amendée, dominée par les espèces des pelouses : *brome dressé, petite pimprenelle, primevère officinale, campanule agglomérée, scabieuse colombarie, laïche glauque, brachypode penné, serpolet, anthyllide vulnérable* (les espèces prairiales peuvent être bien représentées mais ne dominant pas le tapis végétal) = habitat de type **pelouse** 3

3 > présence de la *sauge des prés* et du *sainfoin* (espèces illustrées en couverture), bonne représentation des espèces prairiales = **pelouse mésophile à sainfoin et brome dressé**.

> espèces prairiales peu représentées, absence du *sainfoin* et de la *sauge des prés* = habitats rares de type pelouse 4


4 > sol marneux mais non acidifié. Présence des espèces suivantes : *peucedan corne-de-cerf, lotier maritime, gentiane d'Allemagne, genêt des teinturiers, bugrane épineux, molinie bleue, succise des prés, carline vulgaire*... = **pelouse calcicole et marnicole à chlora perfoliée et brome dressé**.

> sol acidifié, parfois marneux. Présence des espèces suivantes : *genêt des teinturiers, potentille tormentille, bétoine officinale* = **pelouse calcicole acidocline à sieglingie et brachypode penné**.

> sol non amendé soumis à des alternances nettes sécheresse/humidité. Présence des espèces suivantes : *molinie bleue, succise des prés, gaillet boréal, genêt des teinturiers, silaüm silaüs, scorzonère humble, valériane dioïque, colchique, lychnis à fleurs de coucou, grande pimprenelle, trolle d'Europe*... = **prairie des sols non amendés à assèchement estival de surface, à molinie et fétuque roseau** (habitat très rare).

5 > habitat situé en fond de vallée, au contact des milieux humides. Présence d'espèces de milieux humides : *renoncule rampante, silaüm silaüs, brome racémeux, lychnis à fleurs de coucou, colchique, cardamine des prés*... = **prairie de fauche mésohygrophile à colchique et fétuque des prés**.

> conditions ci-dessus non réunies = **prairie de fauche semi-améliorée à gaillet et trèfle rampant**.



petite pimprenelle

brome dressé

primevère officinale

salsifi des prés

renoncule âcre



crépide bisannuelle



knautie des champs




pâturin commun



gaillet blanc



scabieuse colombarie



renoncule rampante

renoncule bulbeuse



laïche glauque



brachypode penné



lychnis à fleurs de coucou



campanule agglomérée



anthyllide vulnérable



gentiane d'Allemagne



lotier maritime



genêt des teinturiers



potentille tormentille



bétoine officinale



serpolet



achillée millefeuilles



peucedan corne-de-cerf



bugrane épineux



berce